

### **INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS PARA IMPLANTES**

- Muerda SUAVEMENTE y CONTINUAMENTE una gasa ligeramente humedecida durante 1 hora o hasta que pare el sangrado activo, repita si es necesario (la gasa aparecerá por lo general de color rosa o rojo, lo cual no indica sangrado activo) y rastros de sangre en la saliva hasta por una semana es normal.
- alimentos puré y líquidos inicialmente mientras entumecido, después alimentos más blandos, por unos días. la consistencia de los alimentos que usted coma durante la cicatrización se determina por su tolerancia y cada persona es diferente Evite beber líquidos con popote por 14 días.
- EVITE tomar a través de pajitas, tomar bebidas gaseosas, enjuague fuerte, escupir por 14 días.
- NO fumar durante un mínimo de 21 días. fumar es una causa conocida por el fracaso del implante.
- Si Suturas / puntos fueron puestos se disolverán en 3-10 días \_\_\_\_, algunas suturas están diseñadas para disolverse lentamente durante 3-4 semanas \_\_\_\_. Mantenga una dieta SUAVE mientras las suturas están presentes.
- Cepille su boca como de costumbre y suavemente cepille el implante como si fuera un diente \_\_\_\_. EVITE la zona (s) quirúrgica con suturas \_\_\_\_.
- Usted puede SUAVEMENTE y FRECUENTEMENTE enjuagar con un enjuague bucal antiséptico comenzando esta noche, preferiblemente con Listerine.
- Si se colocaron implantes en la parte superior y / o injerto óseo de seno nasal se llevó a cabo, algunos rastros de sangre en las secreciones nasales puede ocurrir por varios días. Si se desarrolla hemorragias nasales fuertes por favor llame a nuestra oficina.
- Si un diente temporal fue o es colocado en su implante, es crítico que usted NO muerda en este diente o lo utilice para masticar durante las próximas 12 semanas. El incumplimiento de este causara el fracaso del implante.
- Adormecimiento puede durar 6-12 días. Llame a la oficina si el adormecimiento dura más de 24 horas
- Rigidez de la mandíbula puede durar hasta 10-14 días. Rango limitado de movimiento no es raro
- Tomar todas las medicinas como estén recetadas.
- Si usted está tomando control de natalidad, los antibióticos pueden interferir con su eficacia, por favor, se aconseja la utilización de forma alternativa de control de natalidad durante un mes entero.
- Aplique continuamente compresas de hielo sobre la zona quirúrgica en el exterior para las primeras 48 horas
- Después de 48 horas aplique paquetes calientes húmedos según sea necesario, suspenda la aplicación de hielo.
- La hinchazón generalmente llega al punto máximo hasta 72 horas antes de comenzar a resolver.
- Si problemas inusuales se desarrollan por favor llame a nuestra oficina. si la oficina está cerrada siga las instrucciones de teléfono y deje un mensaje detallado para el Dr. Koos y un servicio de contestador automático contactara al médico para una llamada de regreso.

Steven Koos D.D.S., M.D.  
1827 South Michigan Av.  
Chicago, IL 60616  
312.328.9000

[www.orasurgery.com](http://www.orasurgery.com)  
[drkoos@orasurgery.com](mailto:drkoos@orasurgery.com)

Primera y única oficina de cirugía oral "verde" en Chicago promoviendo odontología ecológica